

Een risicosituatie kunnen identificeren en daar naar handelen



MAANDEN

3 maanden of langer na de blootstelling aan het risico is de autotest VIH® meer dan 99% betrouwbaar

Als de laatste blootstelling aan het risico **minder dan 72 uur geleden is**, verwijst de patiënt dan onmiddellijk door naar de spoeddienst. Stuur de patiënt overdag onmiddellijk naar een aidsreferentiecentrum en s'avonds of in het weekend naar een spoeddienst die gekoppeld is aan een aidsreferentiecentrum.

Daar kan men evalueren of een behandeling na blootstelling (PEP) nut heeft. Deze behandeling kan het risico op een HIV-infectie verlagen op voorwaarde dat de infectie zeer recent is.



MAANDEN

Als er een kans op besmetting met hiv is geweest binnen de afgelopen 3 maanden, is het belangrijk na te gaan of de persoon niet in de vensterperiode verkeert (seroconversie*) en hem aan te raden een arts te raadplegen. De arts zal een hiv-laboratoriumtest laten uitvoeren, die vroegtijdig infecties kan opsporen.

* Seroconversie is de tijd die nodig is om een detecteerbare hoeveelheid antilichamen tegen hiv te ontwikkelen.

Als het resultaat positief is, moet er een test worden uitgevoerd in een laboratorium om het resultaat van de zelftest te controleren/te bevestigen.

Tot op het moment dat het resultaat van de bevestigende test beschikbaar is, moeten alle activiteiten waardoor het hiv-virus kan worden doorgegeven vermeden worden.



De zelftest is niet bedoeld voor de therapeutische opvolging van patiënten die behandeld worden met antiretrovirale middelen. Deze test kan onjuiste resultaten opleveren als u behandeld wordt voor een infectie met hiv (ART of PEP).



Verwijzen naar de testmiddelen, screeningscentra en gezondheidszorginstellingen



We raden u aan op voorhand een lijst te maken met de instellingen zoals de spoeddiensten, verenigingen of de dichtstbijzijnde screeningscentra zodat u de patiënten zo snel mogelijk kunt doorverwijzen.

AAZ ✓
Votre santé sous contrôle

AXONEPHARMA

HIV-TEST IN DE APOTHEEK

Voor alle vragen met betrekking tot doorverwijzing, steun, problemen gelinkt aan hiv of andere seksueel overdraagbare aandoeningen, kan uw patiënt contact opnemen met:

Association Plateforme Prevention Sida
www.preventionsida.org

Expertisecentrum Sensoa
www.seksualiteit.be



AAZ ✓
Votre santé sous contrôle

AXONEPHARMA

De rol van de apotheker



Een vraag naar een autotest VIH® begeleiden



Weten hoe de autotest VIH® werkt



Een risicosituatie kunnen identificeren en daar naar handelen



Verwijzen naar de testmiddelen, screeningscentra en gezondheidszorginstellingen

Een vraag naar een autotest VIH® begeleiden

De test stelt de patiënt in staat, in geval van een positief resultaat, medische hulp te krijgen en een behandeling te kunnen starten. Hoe eerder de behandeling start, hoe meer de levensverwachting van de patiënt het gemiddelde van de algemene bevolking benadert.

Na het vragen naar een autotest VIH®:



De periode vaststellen waarin de patiënt aan het risico is blootgesteld, raadpleeg bladzijde «Een risicosituatie kunnen identificeren»

-18

Een zelftest mag aan een minderjarige afgeleverd worden
Het is desalniettemin belangrijk het advies aan te passen aan de leeftijd van de patiënt




In alle gevallen dient men de aandacht te vestigen op de bestaande middelen die overdracht van hiv kunnen voorkomen

- Condooms en glijmiddelen: voorstellen & goed gebruik uitleggen
- Steriel materiaal voor drugsgebruikers

Weten hoe de autotest VIH® werkt

Het is belangrijk te weten hoe de autotest VIH® werkt en elke gebruiker te wijzen op het belang van het aandachtig lezen van de gebruiksaanwijzing. autotest VIH® mag alleen gebruikt worden met een vers bloedmonster.

NEGATIEVE ZELFTEST




Er is 1 band te zien: de controleband



- Indien de laatste blootstelling aan het risico meer dan 3 maanden geleden is, hoeft de patiënt zich geen zorgen te maken over zijn/haar hiv-status
- Indien er zich in de afgelopen 3 maanden een mogelijkheid tot besmetting met hiv heeft voorgedaan, kan de patiënt niet geheel zeker zijn over zijn/haar hiv-status en moet hij/zij een arts raadplegen.

POSITIEVE ZELFTEST



Er zijn 2 banden te zien: de controleband en de testband



De patiënt moet:

- Een **TEST** laten doen in een laboratorium om het resultaat te **BEVESTIGEN**
- Zichzelf en anderen beschermen

Raad de patiënt aan een arts te raadplegen.

Als geen enkel streepje verschijnt of als alleen het teststreepje verschijnt zonder het controlestreepje, dan is het resultaat onduidelijk en kan uw patiënt hier geen conclusies aan verbinden. In dat geval moet een tweede autotest gedaan worden. Als meerdere, opeenvolgende autotesten een onduidelijk resultaat geven, is het raadzaam een arts te raadplegen.



Een video die het gebruik van de test uitlegt, is te vinden op www.autotest-sante.com

De cijfers in België

38 %

van de hiv-infecties worden laattijdig vastgesteld

2,8

nieuwe diagnoses met hiv per dag (gemiddelde)

1039

nieuwe besmettingen in 2014

