

**Bijsluiter: informatie voor de gebruiker**

## AtrosanMed filmomhulde tabletten

Harpagophytum procumbens D.C. en/ou H. zeyheri L. Decne

**Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.**

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals in deze bijsluiter beschreven of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.

• Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.

• Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat?

Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

• Wordt uw klacht na 8 weken onafgebroken gebruik niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

### Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is AtrosanMed filmomhulde tabletten en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

2. Wanneer mag u AtrosanMed filmomhulde tabletten niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

3. Hoe gebruikt u AtrosanMed filmomhulde tabletten?

4. Mogelijke bijwerkingen

5. Hoe bewaart u AtrosanMed filmomhulde tabletten?

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

### 1. Wat is AtrosanMed filmomhulde tabletten en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

AtrosanMed is een traditioneel kruidengeneesmiddel dat wordt toegepast ter verlichting van:

- reumatische of spierpijn,

- algemene bewegingspijnen en last in spieren en gewrichten,

- rugpijn.

De toepassing is uitsluitend op basis van langdurig gebruik.

Wordt uw klacht na 8 weken onafgebroken gebruik niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Raadpleeg uw arts of apotheker als de symptomen tijdens het gebruik van het geneesmiddel aanhouden of als zich niet in de bijsluiter vermelde bijwerkingen voordoen.

### 2. Wanneer mag u AtrosanMed filmomhulde tabletten niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u AtrosanMed filmomhulde tabletten niet gebruiken?

- U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

- Als u last heeft van zweren in de maag of de twaalfvingerige darm.

- Indien u jonger bent dan 18 jaar.

### Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met AtrosanMed filmomhulde tabletten?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Raadpleeg uw arts:

- als de klachten verergeren.
- indien u na 8 weken onafgebroken gebruik van AtrosanMed geen verbetering van klachten merkt of wanneer klachten terugkeren.
- als de pijn in de gewrichten samen gaat met het opzwollen of rood worden van het gewicht of met koorts.
- als u hartklachten heeft en AtrosanMed wilt innemen.
- als u galstenen heeft en AtrosanMed wilt innemen.

### Kinderen en jongeren tot 18 jaar

AtrosanMed niet gebruiken bij kinderen en jongeren tot 18 jaar.

### Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast AtrosanMed nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

U kunt AtrosanMed samen met andere geneesmiddelen gebruiken.

### Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?

AtrosanMed wordt het best ingenomen onmiddellijk na de maaltijd.

Tijdens het gebruik van AtrosanMed kan er gewoon gegeten en gedronken worden.

### Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding?

Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Er zijn geen gegevens over het gebruik van Duivelsklaauw bij zwangere vrouwen. Uit voorzorg heeft het de voorkeur het gebruik van AtrosanMed te vermijden tijdens de zwangerschap.

Het is niet bekend of Duivels-

klaauw in de moedermelk wordt uitgescheiden. AtrosanMed mag niet worden gebruikt in de periode dat borstvoeding wordt gegeven.

### Rijvaardigheid en het gebruik van machines

In zeldzame gevallen kan AtrosanMed duizeligheid en slaperigheid veroorzaken.

Wanneer dit gebeurt, rijd dan niet of bedien geen machines.

### AtrosanMed filmomhulde tabletten bevat lactose.

Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

### 3. Hoe gebruikt u AtrosanMed filmomhulde tabletten?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.

Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

### 4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

### 5. Comment conserver AtrosanMed comprimés pelliculés

### 6. Contenu de l'emballage et autres informations

### 1. Qu'est-ce que AtrosanMed comprimés pelliculés et dans quel cas est-il utilisé ?

AtrosanMed est un médicament traditionnel à base de plantes utilisé pour soulager:

- les douleurs rhumatismales ou musculaires,

- les douleurs associées aux mouvements en général et les gênes au niveau des muscles et des articulations,

- les maux de dos.

Son application est exclusivement sur la base exclusive de l'ancienneté de l'usage.

Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous sentez moins bien après 8 semaines.

Consultez votre médecin ou votre pharmacien si les symptômes persistent pendant l'utilisation du médicament ou si des effets secondaires non mentionnés dans la notice se produisent.

### 2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser AtrosanMed comprimés pelliculés ?

### N'utilisez jamais AtrosanMed comprimés pelliculés

- si vous êtes allergique à l'extrait de racine d'Harpagophytum procumbens (griffe du diable)

- ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.

### 3. Comment utiliser AtrosanMed comprimés pelliculés ?

### Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant

exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien.

Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Adultes et personnes âgées : prendre 1 comprimé deux fois par jour immédiatement après un repas.

La dose peut être portée à 2 comprimés deux fois par jour si l'on ne constate pas d'amélioration après 3 à 5 jours.

A prendre uniquement par la bouche.

Volwassenen en oudere personen: neem 1 tablet tweemaal per dag in onmiddellijk na de maaltijd.

De dosering kan worden verhoogd tot 2 tabletten tweemaal per dag wanneer er geen beterschap optreedt na 3 tot 5 dagen.

Alleen voor inname via de mond.  
Gebruik niet meer dan de aanbevolen dosering.

Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar  
Niet voor kinderen en adolescenten onder de 18 jaar.

### Heeft u te veel van AtrosanMed filmomhulde tabletten gebruikt?

Wanneer u te veel van AtrosanMed heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

In het algemeen zijn geen bijverschijnselen te verwachten, wanneer u meer dan de aanbevolen dosering van AtrosanMed heeft ingenomen.

### Bent u vergeten AtrosanMed filmomhulde tabletten te gebruiken?

Wanneer u de tabletten vergeten bent in te nemen, neem dan geen extra tabletten, maar neem de eerstvolgende dosis op het gebruikelijke tijdstip.

### Als u stopt met het gebruik van AtrosanMed filmomhulde tabletten

Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen met de behandeling.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

### 4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt daarmee te maken.

De volgende lichte bijwerkingen kunnen zich voordoen bij gebruik van dit geneesmiddel:

Maagdarmklachten:

- ongemakken van de maag,

- zich ziek voelen,

- spijsverteringsongemakken zoals misselijkheid of diarree.

Andere bijwerkingen:

- huiduitslag,

- jeuk,

- hoofdpijn,

- duizeligheid.

Stop met de inname indien deze symptomen u ongemak bezorgen. Raadpleeg uw arts of apotheker wanneer u ongerust bent.

### 5. Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan.

U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via:

Federal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezonhedsproducten

Afdeling Vigilantie

Postbus 97

B-1000 BRUSSEL Madou

Website: [www.eenbijwerkingmelden.be](http://www.eenbijwerkingmelden.be)

e-mail: [adr@fagg.be](mailto:adr@fagg.be)

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

### 5. Hoe bewaart u AtrosanMed filmomhulde tabletten?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

### 6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in AtrosanMed filmomhulde tabletten?

- De werkzame stof in dit middel is het extract van de wortels van Harpagophytum procumbens (duivelsklaauw).

Een filmomhulde tablet bevat

480 mg extract (als droog

ethanolisch extract) van de wortels van de Duivelsklaauw

(Harpagophytum procumbens D.C. en/of H. zeyheri L. Decne).

(1,5-3,0:1). Extractiemiddel:

ethanol 60%V/V.

- De andere stoffen in dit middel zijn: lactose, maïszetmeel,

microkristallijne cellulose,

gezuiverd water, silica, watervrij

colloïdaal silicumdioxide

en magnesiumstearaat

(plantaardige oorsprong).

De coating van de tablet bestaat

uit talk, titaandioxide(E171),

macrogol en hypromellose.

Hoe ziet AtrosanMed filmomhulde tabletten eruit en wat zit er in een verpakking?

AtrosanMed zijn ovale, witte filmomhulde tabletten.

De tabletten zijn verpakt in glazen flesjes met 30, 60 of 120 tabletten.

Het is mogelijk dat niet alle verpakkingen grootte op de markt worden gebracht.

### Registratiehouder en fabrikant

#### Registratiehouder

A.Vogel N.V.

Bosstraat 54 bus 7

B-3560 Lummen

Nederland

#### Fabrikant

A.Vogel B.V.

P.O. Box 33

NL 8080 AA Elburg

Nederland

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de registratiehouder:

A.Vogel N.V.

Bosstraat 54 bus 7

Ne pas dépasser la posologie recommandée.

**Utilisation chez les enfants et adolescents de moins de 18 ans**  
Ne pas utiliser chez les enfants et adolescents de moins de 18 ans.

**Si vous avez utilisé plus d'AtrosanMed comprimés pelliculés que vous n'auriez dû**  
Si vous avez utilisé trop d'AtrosanMed, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le Centre Antipoison (070/245.245).

On ne doit généralement pas s'attendre à des effets indésirables suite à la prise de plus que la dose recommandée d'AtrosanMed.

**Si vous oubliez d'utiliser AtrosanMed comprimés pelliculés**

En cas d'oubli de comprimés, ne prenez pas de comprimés supplémentaires mais prenez la dose suivante à l'heure habituelle.

**Si vous arrêtez d'utiliser AtrosanMed comprimés pelliculés**

Il n'y a pas d'effets à attendre suite à l'arrêt du traitement.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

#### 4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne

surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Les effets indésirables bénins suivants peuvent survenir lors de l'utilisation de ce médicament:

Problèmes gastro-intestinaux :  
• dérangement gastrique,  
• envie de vomir,  
• problèmes digestifs tels que nausées ou diarrhée.

Autres effets indésirables :  
• éruption cutanée,  
• démangeaisons,  
• maux de tête,  
• étourdissements.

Cessez de prendre le médicament si ces symptômes sont gênants. En cas d'inquiétude, adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien.

#### Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via :

Agence fédérale des médicaments et des produits de santé

Division Vigilance

Boîte Postale 97

B-1000 BRUXELLES Madou

Site internet :

[www.notifieruneffetindesirable.be](http://www.notifieruneffetindesirable.be)

e-mail : [adr@afmps.be](mailto:adr@afmps.be)

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

#### 5. Comment conserver AtrosanMed comprimés pelliculés

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Ce médicament ne nécessite pas de précautions particulières de conservation.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'emballage après EXP. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

#### 6. Contenu de l'emballage et autres informations

##### Ce que contient AtrosanMed comprimés pelliculés ?

- La substance active est l'extrait de racine d'Harpagophytum procumbens (griffe du diable). Un comprimé pelliculé contient 480 mg d'extrait (sous forme d'extrait sec éthanolique) de racine de griffe du diable (Harpagophytum procumbens D.C. et/ou H. zeyheri L. Decne). (1,5-3,0:1). Solvant d'extraction : éthanol 60% v/v.
- Les autres composants sont : lactose, amidon de maïs, cellulose microcristalline, eau purifiée, silicium, silice colloïdale et stéarate de magnésium (d'origine végétale). Le film de pelliculage du comprimé est constitué de talc, de dioxyde de titane (E171), de

macrogol et d'hypromellose.

#### Aspect d'AtrosanMed et contenu de l'emballage extérieur

AtrosanMed se présente sous la forme de comprimés pelliculés ovales de couleur blanche.

Les comprimés sont conditionnés en flacons en verre de 30, 60 ou 120 comprimés.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

#### Titulaire de l'enregistrement et fabricant

##### Titulaire de l'enregistrement

A.Vogel N.V.

Bosstraat 54 bus 7

B-3560 Lummen

Les Pays-Bas

##### Fabricant

A.Vogel B.V.

P.O. Box 33

NL 8080 AA Elburg

Les Pays-Bas

Pour toute information complémentaire concernant ce médicament, veuillez prendre contact avec le représentant local du titulaire de l'enregistrement :

A.Vogel N.V.

Bosstraat 54 bus 7

B-3560 Lummen

Tél : 013 35 89 40

e-mail : [info@avogel.be](mailto:info@avogel.be)

#### Mode de livraison

Médicament non soumis à prescription médicale.

#### Numéro de l'enregistrement

BE-TU488000

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est mai 2021.

#### Gebrauchsinformation: Information für Anwender

### AtrosanMed Filmtabletten

Harpagophytum  
procumbens D.C. und/oder H.  
zeyheri L. Decne

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

• Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

• Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.

• Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.

• Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.

• Wenn Sie sich nach 8 Wochen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Konsultieren Sie einen Arzt oder Apotheker, wenn die Symptome bei Anwendung des Arzneimittels weiterbestehen oder andere als die in der Packungsbeilage erwähnte Nebenwirkungen auftreten.

1. Was ist AtrosanMed Filmtabletten und wofür wird es angewendet?

AtrosanMed ist ein traditionelles pflanzliches Arzneimittel, das angewendet wird zur Linderung von:

- rheumatischen bzw. Muskelschmerzen,
- allgemeinen Bewegungsschmerzen und Beschwerden in Muskeln und Gelenken,
- Rückenschmerzen.

Die Anwendung beruht ausschließlich aufgrund langjähriger Anwendung.

Wenn Sie sich nach 8 Wochen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Konsultieren Sie einen Arzt oder Apotheker, wenn die Symptome bei Anwendung des Arzneimittels weiterbestehen oder andere als die in der Packungsbeilage erwähnte Nebenwirkungen auftreten.

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von AtrosanMed Filmtabletten beachten?

AtrosanMed Filmtabletten darf nicht angewendet werden

- wenn Sie allergisch gegen das Extrakt der Wurzeln des Harpagophytum procumbens (Teufelskralle) oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses

Arzneimittels sind.

- wenn Sie unter Magen- oder Zwölffingerdarmgeschwüren leiden.
- wenn Sie unter 18 Jahre alt sind.

#### Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie AtrosanMed anwenden.

Wenden Sie sich an Ihren Arzt:

- wenn sich die Beschwerden verschärfen.
- wenn Sie nach 8 Wochen ununterbrochener Einnahme von AtrosanMed keine Verbesserung Ihrer Beschwerden bemerken oder wenn die Beschwerden erneut auftreten.
- wenn die Gelenkschmerzen mit einer Anschwellung oder Rötung des Gelenkes oder mit Fieber verbunden sind.
- wenn Sie unter Herzbeschwerden leiden und AtrosanMed einnehmen möchten.
- wenn Sie Gallensteine haben und AtrosanMed einnehmen möchten.

#### Kinder

AtrosanMed ist nicht für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre geeignet.

#### Anwendung von AtrosanMed Filmtabletten zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker wenn Sie andere Arzneimittel anwenden, kürzlich andere Arzneimittel angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel anzuwenden.

Sie können AtrosanMed zusammen mit anderen Arzneimitteln anwenden.

#### Anwendung von AtrosanMed Filmtabletten zusammen mit Nahrungsmitteln, Getränken und Alkohol

AtrosanMed wird vorzugsweise direkt im Anschluss an eine Mahlzeit eingenommen. Während der Anwendung von AtrosanMed kann normal gegessen und getrunken werden.

#### Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Über die Anwendung von Teufelskralle bei schwangeren Frauen liegen keine Angaben vor. Vorsichtshalber sollte jedoch die Anwendung von AtrosanMed während der Schwangerschaft vermieden werden.

Es ist nicht bekannt, ob Teufelskralle in die Muttermilch übergeht. AtrosanMed darf während der Stillzeit nicht angewendet werden.

#### Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

In seltenen Fällen kann AtrosanMed Schwindel und Schläfrigkeit verursachen. Sollte dies auftreten, darf kein Fahrzeug gefahren bzw. keine Maschine bedient werden.

#### AtrosanMed Filmtabletten enthalten Lactose.

Bitte nehmen Sie AtrosanMed erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerverträglichkeit leiden.

#### 3. Wie ist AtrosanMed Filmtabletten anzuwenden?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach dem mit Ihrem Arzt oder Apotheker vereinbarten Zeitpunkt.

Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Erwachsene und Ältere: Nehmen Sie zweimal pro Tag 1 Tablette unmittelbar nach der Mahlzeit ein.

Die Dosis kann auf 2 Tabletten zweimal pro Tag erhöht werden, wenn nach 3 bis 5 Tagen keine Besserung eintritt.

Nur zur oralen Einnahme. Nicht mehr als die verschriebene Dosis anwenden.

#### Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre

Nicht für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre.

#### Wenn Sie eine größere Menge von AtrosanMed Filmtabletten angewendet haben, als Sie sollten

Wenn Sie zu viel AtrosanMed Filmtabletten verwendet haben, setzen Sie sich umgehend mit Ihrem Arzt, Ihrem Apotheker oder dem Antigiftzentrum (070/245.245) in Verbindung.

Im Allgemeinen sind keine Nebenwirkungen zu erwarten, wenn Sie mehr als die verschriebene Dosis von AtrosanMed eingenommen haben.

#### Wenn Sie die Anwendung von AtrosanMed Filmtabletten vergessen haben

Wenn Sie die Einnahme der Tabletten vergessen haben, nehmen Sie keine zusätzlichen Tabletten, sondern nehmen Sie die nächstfolgende Dosis zum üblichen Zeitpunkt ein.

#### Wenn Sie die Anwendung von AtrosanMed Filmtabletten abbrechen

Nach dem Abbrechen der Anwendung ist nicht mit Auswirkungen zu rechnen.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

#### 4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Folgende leichte Nebenwirkungen können bei der Anwendung dieses Arzneimittels auftreten:

Magen-Darm-Beschwerden:  
• Magenbeschwerden,  
• Krankheitsgefühl,  
• Verdauungsprobleme wie Übelkeit oder Durchfall.

Andere Nebenwirkungen:

- Hautausschlag,
- Juckreiz,
- Kopfschmerzen,
- Schwindel.

Brechen Sie die Einnahme ab, wenn diese Symptome Ihnen Beschwerden bereiten. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

#### Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt anzeigen über:

Federaler Agent für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte

Abteilung Vigilanz

Postfach 97

B-1000 Brüssel Madou

Website:

[www.notifieruneffetindesirable.be](http://www.notifieruneffetindesirable.be)

E-Mail: [adr@afmps.be](mailto:adr@afmps.be)

Was AtrosanMed Filmtabletten enthält

• Der Wirkstoff ist das Extrakt der Wurzeln des Harpagophytum procumbens (Teufelskralle). Eine Filmtablette enthält 480 mg Extrakt (als ethanolisches Trockenextrakt) der Wurzeln der Teufelskralle (Harpagophytum procumbens D.C. und/oder H. zeyheri L. Decne) (1,5-3,0:1).

Auszugsmittel: Ethanol 60%V/V.

• Die sonstigen Bestandteile sind: Lactose, Maisstärke, mikrokristalline